





Décignation: Chatus 1 Clos 10 Planche & Rang 5 3 Souche Vigueur : Date de Véraison: 7.8.63 Date de Maturité: 10,9,63 +4 Pourriture : 0 GRAPPE: G-M-P-L-M-6115 BAIE : TG - G - ()- P. 15x15 Bl - Gr - Rs - Rg - (N.) Charge: s 10 saveur : 8-m-ar-fox-herb. 8 2 disc - Sph - ell. - Ov. Obev .- cyl - fus. 8 30 s 4 Lavec pépins - apyrène millerandi' s 5: jus : inc. - coloré,

Désignation: Chatas 1 Clos M Planche & Rang & Souche 3 Vigueur : Date de Véraison : 4.8-64 Date de Maturité : 1.9,64 + 3 Pourriture: O (4 on GRAPPE: G - W - P - L - W - C. Pédoncule : L - (1) - C. BAIE: TG - G - M - P. 14al3 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N) Charge : s 16 saveur: 6 - m - ar fox - herb. s 25 disc. - sph. - 611. - Ov. s 31 Obov. - cyl. - fus. s 46 s 5 Z avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: (6) | 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5 Désignation: Chulin Clos (0 Planche & Rang 5 Souche } Vigueur: 5 Date de Véraison : 5.8.65 Date de Maturité V13.9.65 +4 Pourriture 0 14, GRAPPE : G - M - P - L - N - C BAIE : TG - G - CD - P B1. - GAXIA8 - Rg - (N) s 1 | saveur : (8)- m - ar - fox. herb. 8 2 4 disc (sph. - ell. - Ov obov. - cyl. - fus. 836 s 4 5 avec pépins -apyréne s 5 1 jus : inc. - colore

redoncule , L- ()

Année: 1963 Umplacement ... 10... P. S.3..... Désignation Chatus 1

	! Monbre	!		TORTUS .				
	total	1273	11.4	! ! !	10 0 5	!	1	!
A	!	1	!!!!	!	!	1	!	!
2	4	: 2 ×	13 1	į. į	i	į		i !
3	1 3	12 x	12	!	1	!	1	1
4	1 4	14	13	1	!	!!	i !	!
5	! 5	11	174 1	1	!	1		!

D le 27.3 63 x

-9

	Hombre	Nombre !								
	total	! 26-3	1	1	1	!	!	!	!!!	
1	: 1	!	!	!	!	!	!	!	!	
2	! \$! 3 x	!	!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	1	1	!	
3	4	1	1	!	!	i 1	1	!	!	
4	: 5	! 2	!	1	1	!	!	!	!	
5	16	15,	!	i	1	!	!	1	!	

D & 26.3 64x (3)

Année 1965				
N Chalus 1	Planche .	10.853	Côté	**********

	Nombre total	DATES						
		31,3	5,4					
1	4	1	3 1					
2	6	2	3 *					
3	4	1	41					
4	5	0	3 ,					
5	4	2	3,					

\$ 3.4.65 × +6

Année: 1966
Implacement .el 10. P.8.53 Désignation . chalus 1......

	Monbre	1				9	f
	total	1 16.3	21.3	!	! ! ! ! ! ! !	1	!
1	14	121	1 Y 51	1	1 1	!	. !
2	· 6	:	12	!	1 06	1	!
3	; £		2		21/360	1	!!
4	16	13+	144!	0:21	ا ما ار	1	!
5	15	1 1	i	Die	1+71	1	!

Désignation: chatus 1

Clos Ac Planche 8 Côte 5 Rang 3 Souche 1 3 3 4 5

(A) BOURGEOINE ENT.

Colonne

41 - eganoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auvoteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 cuivre 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES PRUILLES DU FLUE.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 globres 4 seteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche (0) fauves ou rousses 1 carminues: à liser, carmine (3) cuivres 4 jaunes 5 à plages bronzees (6) entièrement bronzees 7 vertes 8 autres9.

Dans le cas où la première feuille detachée est à lisere cormine, la couleur de la .º et de la 5° feuille detachées sere notés.

Désignation :

ehatus 1

Clos Ac Planche 8 côté S rang 3 souche I 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux (8) cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Rennes 5. 65

Désignation: chalus 1

Clos 10 Planche 8 Côté 53 Rang souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - nceuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair trala base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

chatus 1

Désignation

Clos 10 Planche 8 Côté S rang 3 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.
 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🕖 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- -- Limbe : plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 6
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 6. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte ① point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,
 - 38: Face inférieure : verte () partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen @ ccurt 3.
- 39 glabre 9 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

gausseroud 7/63

Désignation

chatus 1

Clos 10 Planche 8 Côté \$3 rang souche I 2 6 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne (2)- grande 3 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre () - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 0 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan (1)- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté (4) tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte (1) point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement
 - 38: Face inférieure : verte (1)- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc (2) vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4/- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
 - supérieur à 90º 3. - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3. Lalvo 6.64

Nº d'ordre

Chartin 1

Désignation

ASSAL M Planche

8 coté 5 Nº 3 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Movenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé! - mi-aoûté & - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - 4xe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne D Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - grds 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 irrégulière 2.

28 - Forms: discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - tronccvoïde 4 - cbcvoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9,

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale ; régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilitale déprimée 6 - nou déprimée (7)

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - movenne (-) émaisse 5.

53 - A pulpe charnue 5 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre () fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - nerbacécé - spéciale 7.

31 . A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A hourrelet de couleur verte () - rouge 8 - irrégulière 9.

52 - A bourrelet : 6vident () - peu apparent 2.

32 A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 6

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Calvo 63

Dénominatio	n chalus 1
	Côté . 10 . 2 . 53 . Rang souche 1-2-3-45 -
Planche	soughe 1-25
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). f grêle fort (2). moyen : ramifié (1), peu ramifié (2).
	6
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (6)
Section tra	nsversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	; blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3);
Noeuds	aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Aufois
Mérithalle	de longueur moyenne :
	gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4)
	: plus foncé (de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(5).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon péta	iolaire: étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

d.t.
Nº d'ordre: 0129.13 Désignation: Chatus 1.
Origine:
Emplacement 108-53 Vas Vign
8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3
9-L ₁ /L
10 - L ₂ /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme
17 - Dents: Méd/B
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L ₃ L' ₃
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction: 1 - 2 - 9
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6-6-8. Domeigue

Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2001

Observateur

Code cépage : 0129

Code clone : 12

Nom cépage : Chatris N

Emplacement: 2R7 0166-170

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9 oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 -

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal:

Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes	Fertilité
2/	16.3		4	(grappe/10 yeux)
2		16.3	9	
20	16.3	20.3	5	July
21	13,3		2	5.5
2/			1	J. W
10			15/10 - 150	15
	bourgeons 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	bourgeons début 2/ 16.3 2/ 16.3 2/ 16.3 2/ 16.3	bourgeons début moitié (oiv 301) 2	bourgeons début moitié (oiv 301) (oiv 153) 2

+-14

Date début	Moraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
1405	2465	29/15		17/07	30/07	6/68		(017 300)

mangel

Formulaire de description 2/8 (floraison)

Année: 2001

Code introduction: 12

Code cépage : Nom introduction: Chatus N Observateur

Emplacement 2 R7 s 166. 170

Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 17

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 1 - en liseré 2- partout 3

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte/V- très forte 9

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte/1)- très forte 9 oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 6¹) cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 movenne 5 - forte 1 - très forte 9

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible D- faible 3 moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 11)- très forte 9

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1)- faible 3 moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

Vassal

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées (/- en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204 Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 4 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 🗇 Couleur face sup. blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 -

plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213 (Dans le cas où la 1º feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2º feuille détachée sera notée :

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan o en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 283 - moyenne 215 - très forte 216

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225. Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218-

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible ① - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes [33]

Formulaire de description 3/8

(floraison)

Année

Code cépage :

2001

129 Code introduction: 12

Nomintroduction Chatus N

Observateur TD

Emplacement 2 R7 166-170

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9 oiv 351 vigueur rameaux : très faible B- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges D rouge 3 oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds : verte D- verte à raies rouges 2 - rouge 3 oiv 009 couleur face dorsale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 22- rouge 3 oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte/b- verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 9 - présence 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence D- présence 9

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible 1 - moyenne/5- forte 0

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible I - moyenne 5 - forte 9

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons nulle ou très faible 1) - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) &- subcontinue ou continue (3 ou plus) 2 oiv 017 longueur vrilles : très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 5 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1º inflorescence : jusqu'au 4º noeud () au-delà du 4º noeud 2

oiv 153 nombre inflorescence/rameau : 1 ou moins V- 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4 oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 présence 9

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (+1-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie I - côtelée 2.

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2, - monte 2.

000-21 Couleur des vrilles : jaune (1) - rouge clair (2) - rouge foncé 3 - vert 4

Bouton floral: petit 1 - moyen 2 - gros 3

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année:

2001

Code introduction: 12

Observateur: TD

Code cépage : Nom introduction: Phates N

Emplacement: 2 R7 s166.170

Feuille adulte

oiv 065 taille : très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 grande 7 - très grande 9

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : seuille entière 1 - trois Deing 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé ?

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle D - point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle P-point pétiolaire rouge 2

- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente @ présente 9.

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente? - présente 9.

oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre)

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure

nulle ou très faible V- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne/5)- forte 7 - très forte 9

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 12 présente 9. oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible ? - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9 oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible ? - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9

oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9 sinus pétiolaire ouvernire = 1-2-3-4-5-6 / forme = U-accol. V dent = oui-non / dégarni nou parfois-oni]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole: vert 3 - partiellement coloré & coloré 1

Formulaire de description 5/8 (maturité) Observateur TD Code cépage 129 Code introduction :12 Nom introduction Chatres N Emplacement 2R7s 166. 170 Grappe oiv 202 longueur : très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) D- moyenne (14-18 cm) 5 longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 13,5 oiv 203 largeur : très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 50 large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 14 oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte très compacte 9 oiv 206 longueur pédoncule : très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. han oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7 oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 - en entonnoir 3 oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une à trois ailes 2) plus de trois ailes 3 Baie oiv 220 longueur : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3- moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.) A oiv 221 largeur : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (~26mm) 9. Valeur absolue (en mm.) oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1)- uniforme 3. oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2)- elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 bleu noir 6 oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2 oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9 oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9 oiv 229 ombilic : peu apparent - apparent 2 oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée) - colorée 2 oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée V - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9 oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse/2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9 oiv 236 saveur : aucuno 1) - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5 oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 5 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. 6 m oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3 oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 8 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9 46 oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9 oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1) - présentes 2

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 2001

Code introduction: 12

Code cépage : Nom introduction: Chatus N

Observateur: TD

Emplacement: 2 R7 166 . 170

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3/aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1/2 brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence / présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 17 - présence 9.

oiv 351 vigueur : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) (f)- courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue: 76

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1- petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -

Valeur absolue:

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment: absence 1 – partiellement présente 2 + présente 3.

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année : Code cépage 123 Nom introduction

Chatro N

Observateur TD

templa coment 2 R 7 A 166 . 170

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire Delliptique 3 aplatie 5 oiv 102 surface : unie 1 côtelée 2 - strice 3

oiv 103 confeur générale : jaune D. brunstre ? rouge violacé 3 pris 4

oiv 104 lenticelles absentes P présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds absence Deprésence 9 oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds ; absence Deprésence 9

oiv 351 vigueur - très faible 1 - faible 4 movenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 352 croissance prompts-bourgeous : très faible 4 - faible 3 - movenne 5 - forte 7 - très forte 9

Porte greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9 oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9, oiv 553 aptitude à la phizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds : aplates 1 - 1000 ens@ - saillants 3.

Pruine sur sarment desence 1 partiellement présente 2 présente 3